



Les médicaments dangereux à éviter selon « Prescrire » et commercialisés en France.

Si vous possédez un de ces médicaments, il est recommandé de ne pas s'en servir et les apporter à la pharmacie.

Cardiologie

Le bézafibrate (Befizal°), le ciprofibrate (Liponor° ou autre) et le fénofibrate (Lipanthyl° ou autre)

La dronédarone (Multaq°)

L'ivabradine (Procoralan° ou autre)

Le nicorandil (Ikorel° ou autre)

L'olmésartan (Alteis°, Olmetec° ; et associé avec l'hydrochlorothiazide dans Alteisduo°, Coolmetec° ; et associé avec l'amlodipine dans Axeler°, Sevikar°)

La trimétazidine (Vastarel° ou autre)

Cancérologie

Le défibrotide (Defitelio°)

Le panobinostat (Farydak°)

Le roxadustat (Evrenzo°)

La trabectédine (Yondelis° ou autre)

Le vandétanib (Caprelsa°)

La vinflunine (Javlor°)

. L'**Evrenzo**

Dermatologie

Le finastéride 1 mg (Finastéride Arrow Lab° ou autre)

La méquitazine (Primalan°)

La prométhazine injectable (Phénergan°)

Diabétologie

Les gliptines, alias inhibiteurs de la dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)

Perte de poids

L'orlistat (Xenical° ou autre)

Douleur et rhumatologie

L'acéclofénac (Cartrex° ou autre) et le diclofénac (Voltarène° ou autre) par voie orale

Les coxibs: le célécoxib (Celebrex° ou autre), l'étoricoxib (Arcoxia° ou autre) et le parécoxib (Dynastat°)

Le kétoprofène en gel (Ketum° gel ou autre)

Le méloxicam (Mobic° ou autre), le piroxicam (Feldène° ou autre) et le ténoxycam (Tilcotil°) par voie générale

La capsaïcine en patchs (Qutenza°)

L'association colchicine + poudre d'opium + tiémonium dans la spécialité Colchimax°

La quinine (Hexaquine°, Okimus°), autorisée dans les crampes

Arthrose

La diacéréïne (Art 50° ou autre)

La glucosamine (Flexea° ou autre)

Médicaments "myorelaxants"

Le méthocarbamol (Lumirelax°)

Le thiocolchicoside (Miorel° ou autre)

Ostéoporose

Le dénosumab dosé à 60 mg (Prolia°)

Le romosozumab (Evenity°)

Gastro-entérologie

L'acide obéticholique (Ocaliva°)

La diosmectite (Smecta° ou autre), l'hydrotalcite (Rennieliqo°), la montmorillonite beidellitique alias monmectite (Bedelix°, et en association dans Gelox°) et le kaolin (en association dans Gastropax°).

La dompéridone (Dompéridone Biogaran° ou autre), le dropéridol (Droleptan° ou autre) et la métopimazine (Vogalène°, Vogalib° ou autre ; la dompéridone et la métopimazine).

Le prucalopride (Resolor°)

La teinture d'opium (Dropizal°)

Le trinitrate de glycéryle pommade à 0,4 % (Rectogésic°)

Le **Dropizal**

Gynécologie

La tibolone (Livial° ou autre)

Infectiologie

La moxifloxacine (Izilox° ou autre)

Maladie d'Alzheimer

Le donépézil (Aricept° ou autre), la galantamine (Reminyl° ou autre), la rivastigmine (Exelon° ou autre)

La mémantine (Ebixa° ou autre)

Neurologie

Le (Tanakan° ou autre)

Le naftidrofuryl (Naftilux° ou autre)

Le piracétam (Nootropyl° ou autre)

Maladie de Parkinson

La tolcapone (Tasmar°)

Sclérose en plaques

Le natalizumab (Tysabri°)

Le tériflunomide (Aubagio° ou autre)

Migraine

La flunarizine (Sibelium°) et l'oxétorone (Nocertone°)

Pneumologie et ORL

L'ambroxol (Muxol° ou autre) et la bromhexine (Bisolvon°)

L'oxoméazine (Toplexil° ou autre)

La pentoxyvérine (Pentoxivérine Clarix 0,15 %°)

L'alpha-amylase (Maxilase° ou autre)

Les décongestionnants par voie orale ou nasale (éphédrine, naphazoline, oxymétazoline, pseudoéphédrine, tuaminoheptane)

Le nintédanib (Ofev°)

Psychiatrie

L'agomélatine (Valdoxan° ou autre)

Le citalopram (Seropram° ou autre) et l'escitalopram (Seroplex° ou autre)

La duloxétine (Cymbalta° ou autre), le milnacipran (Milnacipran Arrow° ou autre) et la venlafaxine (Effexor LP° ou autre)

L'eskétagamine en solution pour pulvérisation nasale (Spravato°)

La tianeptine (Stablon° ou autre)

La dapoxétine (Priligy°)

L'étifoxine (Stresam°)

Sevrage tabagique

La bupropione (Zyban°)

Urologie

Le pentosane polysulfate oral (Elmiron°)